

## FICHA TÉCNICA



### Nombre Comercial: Edo Penicilina Triple

Antibiótico a base de Penicilina G Benzatínica, Penicilina G Procaínica, Penicilina G Potásica.

### Función:

Antibiótico de amplio espectro de acción prolongada contra bacterias gram + y gram -.

### Composición garantizada:

Cada mL de producto reconstituido contiene:

6:3:3 de 7'500.000 U.I. contiene:

Penicilina G Benzatínica.....125.000 U.I.

Penicilina G Procaínica.....93.750 U.I.

Penicilina G Potásica.....93.750 U.I.

Equivalentes a 312.500.00 U.I. de Penicilina G total


6:3:3 de 10'000.000 U.I. contiene:

Penicilina G Benzatínica.....4.000.000 U.I.

Penicilina G Procaínica.....3.000.000 U.I.

Penicilina G Potásica.....3.000.000 U.I.

### Especies de uso:



Bovinos

Equinos

Porcinos

Ovinos

Caprinos

Caninos

### No. de registro:

No. de registro para presentación de 10.000.000 UI: ICA: 5570-MV

No. de registro para presentación de 7.500.000 UI: ICA: 5569-DB

### Presentaciones del Producto:

7.500.000 U.I. - 10.000.000 U.I.

### Dosis:

Presentación 10.000.000 U.I.: Aplicar 1 mL del producto reconstituido por cada 20 Kg de peso. La duración y frecuencia del tratamiento dependen del criterio del Médico Veterinario.

Presentación 7.500.000 U.I.: Para todas las especies aplicar según la tabla de dosificación o a criterio del Médico Veterinario.

<b>Peso animal en Kg</b>	18,75 Kg	56,25 Kg	112 Kg	225 Kg	450 Kg
<b>Volumen de suspensión</b>	1 mL	3 mL	6 mL	12 mL	24 mL



### Vía de Administración / Modo de Uso:



Vía intramuscular profunda exclusivamente.

### Indicaciones:

En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y gatos; para el tratamiento de infecciones producidas por microorganismos sensibles a la penicilina G tales como: *Streptococcus sp.*, *Actinomyces sp.*, *Actinobacillus sp.*, *Corynebacterium sp.*, *Clostridium sp.*, *Leptospira sp.*, *Bacillus anthracis*, *Erysipelothrix sp.*, *Nocardia sp.*, *Fusobacterium sp.* y *Listeria sp.*

### Contraindicaciones:

No administrar a pacientes sensibles a la penicilina G o a la Procaína. Estos pueden producir desde reacciones de hipersensibilidad (manifestaciones urticariformes) hasta shock anafiláctico.

**Precauciones:**

Se recomienda utilizar equipos inyectables estériles.  
No mezclar en la misma jeringa o envase con ningún otro producto.

Venta bajo formula del Médico Veterinario.

**Tiempo de Retiro:**

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de haber finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Manténgase en un lugar fresco, protegido de la luz, calor y altas temperaturas.

**Código de barras:**

PENICILINA TRIPLE 7.5: 7707240052532

PENICILINA TRIPLE 10: 7707240052549



FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Noviembre 29 de 2018