

FICHA TÉCNICA



Nombre Comercial: Edo Dipirona

Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio
Dipirona 5%

Función:

Útil para el tratamiento sintomático de afecciones caracterizadas por dolores agudos y fiebre, de rápida acción.

Efectivo en cólicos en equinos y bovinos.

Composición garantizada:

Cada mL contiene:

Dipirona (Metamizol).....500 mg

Excipientes c.s.p.....1 mL

Especies de uso:



Bovinos



Equinos



Porcinos



Ovinos



Caprinos



Caninos

No. de registro:

Registro ICA N° ICA 8721-MV-Colombia

Presentaciones del Producto:

20 mL, 50 mL, 100mL

Dosis:

A criterio del Médico Veterinario.

Bovinos y Equinos: 6 mL/100 Kg de peso que equivale a 30 mg / Kg de peso, cada 8 horas.

Ovinos, Caprinos y Porcinos: 2 mL / 25 Kg de peso que equivale a 40 mg / Kg de peso, cada 12 horas.

Perros y gatos: 0,5 mL / 10 Kg de peso que equivale a 25 mg / Kg de peso, cada 8 horas.



Vía de Administración / Modo de Uso:



Inyección intramuscular o intravenosa lenta.

Bovinos y Equinos: Vía intravenosa, intramuscular
Ovinos, Caprinos y Porcinos: Intramuscular, Intravenosa.
Perros y Gatos: Intramuscular, Intravenosa.

Indicaciones:

Analgésico, antiespasmódico, antipirético y anti-inflamatorio. Útil como coadyuvante en el tratamiento del cólico y episodios de dolor en equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.

Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario.

Precauciones:

Seguir las indicaciones del Médico Veterinario.

No aplicar por vía subcutánea.

No usar por períodos prolongados de tiempo.

No aplicar conjuntamente con anticoagulantes como la warfina, ni asociado o junto a tratamientos con Fenilbutazona o Barbitúricos.

La Dipirona puede causar agranulocitosis y leocopenia.

También se ha descrito la producción de Nefritis Tubular y convulsiones en caso de sobredosis.

Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 2 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo, no debe darse para consumo humano.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Uso veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Consérvese en lugar fresco y seco.

Código de barras:

EDO DIPIRONA X 20 mL: 7707240051917

EDO DIPIRONA X 50 mL: 7707240051924

EDO DIPIRONA X 100 mL: 7707240052273



FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Noviembre 29 de 2018